


INFORMACIÓ TRACTAMENT PEGATS DE FENTANIL



Mira el [VIDEO](#) informatiu

Què CONTENEN aquests pegats?



Contenen FENTANIL, un medicament OPIOIDE per al tipus de dolor que vostè pateix, crònic, fort i constant.

Si no s'utilitzen correctament i per al tipus de dolor indicat, poden causar efectes secundaris importants.

IMPORTANT

a tenir en compte les següents indicacions i les possibles reaccions secundàries durant el seu ús



- **No prengui alcohol ni medicació per a dormir** (excepte indicació mèdica).
- **No comparteixi** aquests pegats amb altres persones.
- Mantingui'ls en un lloc **allunyat de nens i mascotes**. Si accidentalment se'l posen o se'l fiquen a la boca telefoni urgentment al **061** i tracti de mantenir a la persona desperta. **Pot tenir conseqüències MOLT GREUS.**
- **No canviï la dosi** sense consultar-ho ni suspengui el medicament.
- Si el pegat cau o es desenganxa, tregui'l del tot i **col·loqui-se'n un de nou** en una altra zona.
- Pot dutxar-se o nedar amb el pegat. **És resistent a l'aigua.**
- **ALERTA!** No li pot donar escalfor a la zona del pegat.

Com utilitzar-los? Pas a pas...




Asseguri's bé d'entendre quina és la dosi indicada i com l'ha d'usar.

S'ha de canviar **cada 3 DIES** i col·locar-se sempre a la mateixa hora (si té indicats més d'un pegat, canviï'ls tots alhora).

INFORMACIÓ TRACTAMENT PEGATS DE FENTANIL



COL·LOCACIÓ del pegat



- 1 Triï una zona plana** del cos (com l'esquena o el pit).
 - No el posi en zones on vagi a portar una peça ajustada
 - Ha de buscar un lloc diferent del que va retirar el pegat vell
- 2 Comprovi que la pell **no té ferides** i que **està seca, neta i sense berriscol**.**
 - Si ha de netejar la zona, **no utilitzi sabó ni cremes**.
 - **No apliqui el pegat** a la pell calenta, per exemple, després d'una dutxa calenta.
 - **Si té berriscol** a la zona que on el col·locarà, talli'l el més curt possible que pugui de la pell sense afaitar-ho per a no irritar-la.
- 3 Obri el sobre** que conté el pegat per la zona indicada i comprovi que no està danyat.
- 4 Desenganxi el plàstic protector** des del centre procurant **no tocar la part adhesiva**.
- 5 Pressioni** amb el palmell de la mà uns **30 segons** perquè quedi ben enganxat (especialment a les cantonades).
- 6 Renti's bé** les mans després de tocar el pegat.
- 7 Anoti el dia i l'hora** que se l'ha posat per a recordar més fàcilment quan ha de tornar a canviar-se'l.

RETIRAR el pegat usat

Abans de posar-se un pegat nou, retiri l'anterior. En treure'l, assegurí's de **doblegar-lo per la meitat i enganxar-lo sobre si mateix**.

CONSULTAR amb el seu metge o infermera

Si presenta **restrenyiment, nàusees o marejos**, ja que pot ser necessari ajustar el seu tractament.

Acudir a URGÈNCIES

Si nota alguna d'aquestes reaccions secundàries:

- Si li costa mantenir-se despert
- Si la seva respiració és més lenta
- Si té batecs molt lents

Aquest document no reemplaça la necessitat de seguir les instruccions del seu metge.
Per a més informació llegeixi's el prospecte.