



FULL INFORMATIU

IMMUNOTERÀPIA SUBCUTÀNIA (VACUNA)



És un tractament que ajuda a reduir els símptomes de l'al·lèrgia. Es posa una vacuna per sota de la pell perquè el cos s'hi acostumi i redueixi la seva reacció al·lèrgica.


Durada del tractament: 3 a 5 anys. Els efectes es noten a partir dels 6 mesos.

IMPORTANT



- La vacuna **SEMPRE s'administra en un centre sanitari** per personal mèdic o d'infermeria. Mai a casa.
- Si oblida portar el seu carnet de vacunació o immunoteràpia, **no se li podrà administrar**.
- **Després de posar-se la vacuna**, cal esperar **30 minuts** al centre sanitari per precaució de possibles efectes secundaris.


Informació general




No es pot administrar si està malalt: Febre
Mal de coll
Sensació d'ofec
Gastroenteritis



La vacuna s'ha de **guardar a la nevera** (NO congelar)



Pot estar fora de la nevera fins a 48h sense estar exposada al sol



Cal portar la vacuna amb el seu envàs original (No fer servir gel per transportar la vacuna)



S'administra en braços alterns i a temperatura ambient

FULL INFORMATIU IMMUNOTERÀPIA SUBCUTÀNIA (VACUNA)

Recomanacions després de la vacuna



No faci exercici en
les següents 6 hores



No prengui el sol ni s'exposi
a calor extrema:

- Sauna
- Aigua calenta




Si la zona de la punxada es posa vermella o s'infla, **apliqui fred local** i pot prendre antihistamínic. Si dura més de dos o tres dies **consultar amb el servei d'al·lergologia**



No donar massatge en el punt de la vacuna

ALTRES VACUNES



Si necessita una altra vacuna **consulti amb el seu metge**.

Les vacunes com la de la grip o la del COVID-19, **es recomana separar-les** per una setmana per evitar efectes secundaris.

